

Fabogesic

Niños

Ibuprofeno 2%

Libre de Azúcar,
Sacarina y
Ciclamato



Suspensión oral
Vía de administración oral
Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR
EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene FABOGESIC NIÑOS?

FABOGESIC NIÑOS contiene 2 gramos de Ibuprofeno cada 100 ml de suspensión. Otros componentes de la suspensión: Tween 80; Benzoato de Sodio; Aspartame; Acesulfame potásico; Goma xántica; Sorbitol 70%; Ácido cítrico; Glicerina destilada; Colorante rojo allura C.I. 16.035; Esencia de cereza líquida; Esencia de banana líquida; Metilparabeno sódico (Nipagin); Propilparabeno sódico (Nipasol); Agua purificada c.s.p. 100 ml.

Acciones:

Calma el dolor, alivia la fiebre y la inflamación.

¿Para qué se usa FABOGESIC NIÑOS?

Se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, de dientes y de cabeza. Resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

¿Qué personas NO pueden recibir FABOGESIC NIÑOS?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al ibuprofeno o a alguno de los ingredientes de la fórmula.

No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte a su médico:

- Si el niño se encuentra recibiendo otra medicación, presentó problemas o efectos adversos al emplear antitérmicos o antiérgicos,

- Si no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran. Si el dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción de la piel, náuseas y/o vómitos.

- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos; si en el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción, si aparecen síntomas nuevos.

- Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé.

- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos.

- No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.

- No debe usar este medicamento para aliviar el dolor de estómago o abdomen.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos adversos no deseados causados por el medicamento, como trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor de estómago), erupción en la piel con ronchas y/o picazón, alteraciones respiratorias (dificultad para respirar y/o sensación de falta de aire), vértigo y dolor de cabeza. Raramente el tratamiento puede producir alteraciones de los análisis de laboratorio (aumento de enzimas hepáticas), retención de líquidos, y disminución de los glóbulos blancos.

SI EL DOLOR O LA FIEBRE PERSISTEN POR MÁS DE 2 DÍAS O EMPEORA
CONSULTE A SU MÉDICO.

Advertencias y precauciones

Este medicamento contiene 0,25 g de sorbitol por cada 5 ml como excipiente, que puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Hable con su médico o farmacéutico si usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo "Infecciones").

Infecciones:

Como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. FABOGESIC NIÑOS puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que FABOGESIC NIÑOS pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

Precauciones Cardiovasculares:

Los medicamentos antiinflamatorios/analgésicos como ibuprofeno se pueden asociar con un pequeño aumento del riesgo de sufrir un ataque al corazón o un Ictus, en especial cuando se utiliza en dosis altas.


No supere la dosis ni la duración del tratamiento.

Cómo usar FABOGESIC NIÑOS

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

¿Cómo se usa FABOGESIC NIÑOS?

- 

Abrir la tapa de seguridad presionando hacia abajo y luego girar en la dirección que indica la flecha.
- 

Coloque la tapa dosificadora en la boca del frasco (este paso debe realizarse solamente en el primer uso).
- 

Inserte el pico de la jeringa en la tapa dosificadora.
- 

Invierta el frasco y extraiga la cantidad de suspensión, según la tabla de dosificación, tirando el émbolo hacia atrás.

Luego de utilizar, cierre el frasco simplemente girando la tapa sin hacer presión. Lave la jeringa dosificadora con abundante agua, seque y guarde en el estuche para la próxima utilización. Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad.

Peso (Kilos)	Edad (años)	Dosis (ml)
Menos de 11	Menos de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2 a 3	5 ml (1 jeringa)
16 a 21	4 a 5	7,5 ml (1 y 1/2 jeringas)
21 a 27	6 a 8	10 ml (2 jeringas)
27 a 32	9 a 10	12,5 ml (2 y 1/2 jeringas)
Más de 32	Más de 10	15 ml (3 jeringas)

En caso que sea necesario, repetir la dosis cada 8 horas. No administrar más de 3 veces al día.

En niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.
¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel.: (011) 4654 6648

Centro de Toxicología de la Facultad de Medicina (UBA)
Tel.: (011) 4961 8447

¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267. También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

Conservación:

Mantener a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, lejos del calor y la luz solar directa.

Presentación:

Envases conteniendo 1 frasco x 100 ml.

1007389

Emisión: 09/20

Revisión: 12/07

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

SAVANT PHARM S.A.

Complejo Industrial RN N° 19, Km 204, Córdoba, CP: X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 51.406

Elaborado en Argentina.

En Bolivia: R.S. II-74127/2020.

En Paraguay: Importado por Savant Pharm Paraguay S.A., Benjamin

Constant 835, Asunción. Regente Farm. Livia Ortellado, R.P.N°2.408.

Aut. por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S. Cert. N° 14703-02-EF.

En caso de sobredosis: recurrir al Centro Nacional de Toxicología sito en General Santos casi T. Mongelós: Tel. 220.418.

Condición de venta en Paraguay: Venta bajo receta.

☎ 0810 - 444 - 32267

☎ www.savant.com.ar

SAVANT